



イチゴ編

病害虫注意報 2024年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

天敵導入後1～2週間は、定着させるために薬剤散布や葉かきは控えましょう！



スパイカルプラスUM新発売！

パックを枝などに吊るすだけ！放飼作業を省力化した
スパイカルプラスがUMとなってさらに使いやすくなりました！

従来品と比較したスパイカルプラスUMの特徴

- ・生分解性樹脂袋が採用されたパック製剤
- ・カブリダニの増殖・放出量が従来品より増加
- ・遮光性・耐水性・保湿性に優れた素材の採用
- ・露地栽培でも雨の影響を軽減
- ・フック部分が厚く丈夫に（防水加工の改善）

天敵導入後 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナミナミ	ミカド	ナミ
11月③	9,U13	灰色かび病 うどんこ病	予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	25A	ハダニ類 シラメンホリダニ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日		0日	
	10A	ハダニ類 (ハダニ類の多発時は追加)	ニッソラン水和剤 卵にも効果あり	2,000～ 3,000倍	前日	2回	0日	1日	0日	
12月①	2	灰色かび病	予 ロブラール500アクア	1,000～ 1,500倍	前日	4回	1日		0日	
	20D	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵にも効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
12月②	M07	うどんこ病・黒斑病 炭疽病 灰色かび病	予 ベルクートフロアブル	2,000倍 (うどんこ病 2,000～ 4,000倍)	前日 (生育期)	5回	0日		0日	
	—	アブラムシ類・コナジラミ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン	1,000倍	前日	—	0日		1日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

トリオバイタル

スパイデックスバイタル：
餌入り製剤でより安定した防除効果を発揮

餌入り製剤2種の
同時訪飼で
ハダニをきっちり防除！

