



キク編

病害虫注意報 2024年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白さび病の発生に注意しましょう！

閉めきったハウス内は湿度が高くなり、白さび病が発生しやすくなります。
また、低温期ですが乾燥しやすい所を中心にハダニ類の発生にもご注意ください。



症状

- ▶ 葉に白い隆起した斑点が発生。
- ▶ 茎、葉柄、花梗、ガクに発生する場合もある。

多発条件

- ▶ 15～20℃の気温。
- ▶ 多湿条件（湿度90%以上）や葉の結露。
- ▶ 降水量が多く、比較的冷涼な時期。
- ▶ 肥料不足、または極端な窒素過多。

対策

- ▶ 循環扇によるハウス内の温度・湿度ムラを減らす。
- ▶ 予防的に薬剤散布を行う
- ▶ 適切な施肥量で管理を行う
- ▶ 排水不良圃場では、排水を良好にする。
- ▶ 発病株は伝染源になるため、抜き取り、焼却もしくは土中深くに埋める。

今月のおすすめローテーション



地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては被害が発生する
場合があるためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
定植時	P02	白さび病	inochioキクツチャ粒剤	6～9kg/10a (作条土壌混和)	定植時	1回
生育初期	M03	白さび病	予 ジマンダイセンフロアブル	500～800倍	—	8回
	2A	ハダニ類	ペンタック水和剤※	1,000倍	—	—
消灯時	11	白さび病・褐斑病	予・治 メジャーフロアブル	2,000倍	発病初期	3回
	23	アザミウマ類・アブラムシ類 ハダニ類	inochioセイレーンフロアブル	2,000倍	発生初期	3回
発蕾時	39	白さび病・アブラムシ類 うどんこ病	予 プリカット乳剤	1,000倍 (うどんこ病：2000倍)	発生・発病初期	6回
	20D	ナミダニ	予・治 マイトコーネフロアブル	1000倍	開花前まで	1回
破蕾時	7	白さび病	カナメフロアブル	4,000～8,000倍	発病初期	3回
	25A	ハダニ類	ダニサラバフロアブル※	1,000倍	発生初期	2回

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

※花き類・観葉植物登録

海藻サンバ

育苗期・生育期:1,000倍

イノチオのバイオスティミュラント！
光合成・発根の促進におすすめ

- ▶ コリンによる**光合成促進**と**発根促進**
- ▶ 海藻エキスによる**発根促進**
- ▶ 転流を促進



肥料登録番号
生第101491号

置型しなもん

温風加湿器の吹き出し口付近に置くだけ！

有効成分はシナモンの主成分と同じ
ハチや天敵への影響も少ない剤です

灰色かび病 30ml/10a/日

