



キュウリ編

病害虫注意報 2024年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害特集

閉めきったハウス内は湿度が高くなり**べと病**、**つる枯病**発生の原因となります。
アザミウマ類の発生にも注意が必要です！天敵導入前の防除を心掛けましょう！

べと病



- 症状** ▶葉に発生
▶葉脈に囲まれた多角形の黄色の病斑
- 多発条件** ▶20～24℃
▶多湿
▶肥料切れ
- 対策** ▶密植を避ける
▶適切な肥培管理
▶排水をよくする

つる枯病



- 症状** ▶茎、葉に発生
▶病斑上に黒色小粒点を生じる
- 多発条件** ▶20～24℃
▶多湿
▶窒素過多
▶成り疲れ
- 対策** ▶適切な肥培管理
▶灌水時の水はねに注意する
▶高うねにする

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫		薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	スワスター天敵影響日数
①	52	つる枯病・菌核病 灰色かび病、炭疽病	予	ミギワ10フロアブル	1,000倍	前日	3回	0日
	15	コナジラミ類・ウリメカイ		マツチ乳剤	2,000倍	前日	3回	0日
②	24, M01	べと病・うどんこ病 斑点細菌病	予・治	カッパーシン水和剤	1,000倍	前日	5回	7日
	6	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類		アグリメック	500～1,000倍	前日	2回	7日
③	7	つる枯病・うどんこ病・褐斑病 菌核病・灰色かび病	予	ケンジャフロアブル	1,500倍 (菌核病・灰色かび病: 1,000～1,500倍)	前日	4回	0日
	5	アザミウマ類・ハダニ類 ウリメカイ		スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	前日	2回	14日
④	11, M05	べと病・うどんこ病 灰色かび病・炭疽病等	予・治	アミスターオブティ フロアブル	1,000倍	前日	4回	—
	4C	アブラムシ類・コナジラミ類		トランスフォームフロアブル	2,000倍 (コナジラミ類: 1,000～2,000倍)	前日	2回	0日

ミギワ10フロアブル

FRACコード：52

灰色かび病・菌核病
炭疽病・つる枯病

1,000倍

収穫前日まで/3回以内
マルハナバチ影響日数：1日



- 新規作用機構で既存剤の耐性菌に有効です。
- 予防効果主体のため、発病前からの使用をおすすめします。
- 浸透移行性があります。



規格：500ml

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す！

NEW-SB酸素

根張り促進や成り疲れ
防止に灌水処理が
お勧め！

10kg/10a
7～14日おき灌水処理

