



イチゴ編

病害虫注意報 2024年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫のシーズンとなりましたが、病害虫蔓延を防ぐために初期防除を心がけましょう！

収穫中 おすすめローテーション

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
12月③	7,11	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	予・治 シグナムWDG※	2,000倍 (灰色かび病 1,500~2,000倍)	前日	2回	0日	—	0日	—
	25A	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵にも効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
1月①	9,U13	うどんこ病 灰色かび病	予・治 ショウチノスケ フロアブル	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	15	アザミウマ類 ハモシトリ	マッチ乳剤	アザミウマ類 1,000~2,000倍 ハモシトリ 3,000倍	前日	4回	1日	0日	0日	
1月②	7	うどんこ病 灰色かび病	予 ケンジャフロアブル	1,500倍	前日	3回	1日		0日	
	25A	ハダニ類 シラメンホリガニ	スターマイト フロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日		0日	

※カンタスドライフロアブルとの使用回数注意

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！ 光合成能力UP！

ファイトオーツ&ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶糖の転流促進

▶毛細根の充実

▶抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム

+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！

★日照不良時の代謝の向上！



アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などとの混用はさけてください



肥料登録
生第83241号

肥料登録
生第87201号

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す！

NEW-SB酸素

根張り促進や成り疲れ

防止に灌水処理が

お勧め！

10kg/10a

7~14日おき灌水処理

