



イチゴ編

病害虫注意報 2025年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心がけましょう！



収穫中 おすすめローテーション



対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミコ	刊
1月 ③	11	炭疽病 灰色かび病	予・治 ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000～3,000倍 (炭疽病：2,000倍)	前日	3回	1日		0日	
	—	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	—	0日		1日	
天敵導入										
2月 ①	7,11	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	予・治 シグナムWDG	2,000倍 灰色かび病： 1,500～2,000倍	前日	2回	0日	—	0日	—
	34	アザミヤマ類	ファインセーブ フロアブル	1,000～2,000倍	前日	3回	1日		0日	
2月 ②	9	うどんこ病 灰色かび病	予・治 フルピカフロアブル	2,000～3,000倍	前日	3回	0日		0日	
	15	アザミヤマ類 ハスモンヨトウ	マッチ乳剤	1,000～2,000倍 ハスモンヨトウ：3,000倍	前日	4回	1日	0日	0日	

根張り改善に！

ファイトメット

100～150g/10aまたは
2,000～3,000倍灌水

根張りが悪くなる冬期・収穫期
新しい根を出すチカラを！！

▶毛細根の充実に！

▶リン酸・ミネラル分の吸収UP！



肥料登録
輸第84050号

チップバーン対策に！

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性！
ケリシンバタイン配合！
軟弱果対策にも
おすすめです！

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す！

NEW-SB酸素

根張り促進や成り疲れ
防止に灌水処理が
お勧め！

10kg/10a

7～14日おき灌水処理

