



ナス編

病害虫注意報 2025年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ミナミキイロアザミウマ・コナジラミ類等の発生が多くなりやすい時期です。発生確認前から予防的に防除しましょう。



アザミウマ吸汁痕



アザミウマ類成虫



外ハコナジラミ成虫



ハコナジラミ成虫

おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数		
							ミツバチ	マルハ	スルスキー
2月①	7	灰色かび病・すすかび病 うどんこ病 等	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日
	6	アザミウマ類・コナジラミ類 ハダニ類	アグリメック	500～1,000倍	前日	3回	14日	7日	7日
2月②	7, 11	灰色かび病・すすかび病 うどんこ病 等	予・治 シグナムWDG	1,500倍 (すすかび病 1,500～2,000倍)	前日	3回	0日	—	0日
	5	アザミウマ類・コナジラミ類 ハダニ等	ディアナSC	2,500～5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	3日	1日	14日↑
2月③	19	うどんこ病 灰色かび病 等	予・治 ポリオキシシンAL水溶剤	5,000倍	前日	3回	0日		14日
	15	アザミウマ類 外ハコナジラミ	マッチ乳剤	2,000倍	前日	4回	1日	0日	0日
2月④	11	うどんこ病 すすかび病 等	予・治 ファントジスタ 顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	1日		0日
	34	アザミウマ類 外ハコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	ファインセーブ フロアブル	1,000～2,000倍 (外ハコナジラミ類1,000倍)	前日	3回	1日		0日

厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！ 光合成能力UP!

ファイトオーツ & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶糖の転流促進
- ▶毛細根の充実
- ▶抵抗性誘導物質の向上

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などの混用はさけてください



肥料登録
生第83241号



肥料登録
生第87201号

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!

置型しなもん

温風加温器の
吹出口付近に
置くだけ!



すすかび病30ml/10a/日